

Vaksinering av 04- og 05-kullet - Samtykkeskjema for foresatte

Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere. FHI anbefaler at 16 og 17 åringer får tilbud om vaksinering. Det inkluderer 04- og 05-kullet. For de i 05-kullet som ikke har fylt 16 år på vaksinedatoen, trenger samtykke fra foresatte.

Før vaksinasjon

Gi beskjed dersom barnet har allergi. Det er vanlig å utsette vaksinasjon ved akutt sykdom og ved feber over 38 grader. Barnet ditt er anbefalt vaksine på bakgrunn av alder, og eventuelle grunner til at barnet ikke bør vaksineres må diskuteres med egen lege. Gi beskjed om barnet har gjennomgått Covid-19, det vil da være nok med en dose vaksine.

Ved delt foreldreansvar må begge samtykke til vaksinering av barnet

Barnets navn: _____

Fødselsdato: _____

Jeg/vi ønsker at barnet mitt/vårt barn vaksineres mot covid-19:

Dato: _____

Foresatte med foreldreansvar:

| | |
|---|---|
| Foresatt 1: <i>Fullt navn (skriv tydelig):</i> | Foresatt 2: <i>Fullt navn (skriv tydelig):</i> |
| <i>Telefonnummer:</i> | <i>Telefonnummer:</i> |
| <i>Underskrift:</i> | <i>Underskrift:</i> |

Om covid-19

Covid-19 gir i hovedsak luftveisinfeksjon, men det kan også være andre symptomer. Høy alder og voksne med kroniske sykdommer har størst risiko for å få alvorlig covid-19 sykdom. Barn som blir syke har oftest et lett forløp med milde og kortvarige luftveissymptomer. Ungdom får oftere mer generell sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Risiko for alvorlig sykdom hos barn og ungdom er lav, også for de som har underliggende sykdom. Få ungdommer har blitt alvorlig syke av koronaviruset, men det er en del smitte blant 16-17-åringer. Vaksinasjon vil bidra til å beskytte de få som kan bli alvorlig syke hvis de smittes, i tillegg til å redusere smittespredning i samfunnet. Redusert smittespredning i aldersgruppen som følge av vaksinasjon er nødvendig for å kunne lette på restriksjoner som har vært spesielt belastende for unge under pandemien.

Om vaksinen

Comirnaty® (BioNTech og Pfizer) er en mRNA vaksine. Vaksinen inneholder ikke levende virus og kan ikke gi koronainfeksjon. Vaksinen er godkjent til bruk fra 12 år. To doser gis med 8-12 ukers intervall. De aller fleste bivirkningene oppstår 1-2 dager etter vaksinasjon, er milde/moderate og går over etter noen dager. For noen vil symptomene kunne være mer kraftige. Denne vaksinen ser ut til å gi mer av de vanlige bivirkningene enn det man er vant til for andre vaksiner. De vanligste bivirkningene er smerter og hevelse på injeksjonsstedet, tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Allergiske reaksjoner forekommer hos enkelte. Det er god kunnskap om vanlige bivirkninger etter vaksinasjon, men sjeldne bivirkninger kan ikke utelukkes. Mer informasjon om Comirnaty vaksinen finnes på fhi.no.

Tønsberg kommune vil i hovedsak tilby Comirnaty på dager der aldersgruppen er innkalt. På andre dager kan Spikevax fra Moderna tilbys om Comirnaty ikke er tilgjengelig. For informasjon om Spikevax, se fhi.no